

## Miért kell a kutyámat vakcinázni?

Ha a kutyákat nem részesítjük megfelelő védőoltásokban, nagy a kockázata annak, hogy megkapja valamelyik végzetes fertőző betegséget. A két legelterjedtebb fertőző betegség a parvovírusos bélgyulladás és a szopornyica, de védekeznünk kell a fertőző májgyulladás és a leptospirosis ellen is. Egyes fertőző májgyulladás elleni, valamint parainfluenza vírust és Bordetella bronchiseptica-t is tartalmazó vakcinák a kennel (járványos) köhögés ellen is védenek. Annak ellenére, hogy a Corona vírusos hasmenés általában más fertőző betegségekhez társulva szokott jelentkezni, bizonyos körülmények között mégis indokolt ellene a védőoltás.

Szükséges a védőoltások idejében történő végrehajtása azért is, mert a súlyosan megbetegedett állatot nem, vagy csak hosszadalmas és költséges kezelés árán lehet meggyógyítani.

## Immunitás és vakcináció

### Mi az immunitás?

Ha egy állat (vagy egy személy) immunis (ellenálló) egy bizonyos betegséggel szemben, az azt jelenti, hogy nem áll fenn annak a veszélye, vagy csak kicsi a valószínűsége annak, hogy abban megbetegedjen.

Egy felnőtt kutyában az ellenállóképesség a

- rendszeres védőoltások, vagy
- a betegség esetleges átvészelése következtében alakul ki.

## És a kölykök immunitása?

Feltételezhető, hogy a szuka ellenálló a fertőző betegségekkel szemben, ezért a kölykei az első tejjel (koloszttrum) átadott ellenanyagok révén életük első néhány hetében szintén védettek lesznek. Sajnos az így szerzett immunitás idővel csökken, és a növekvő kölykök fogékonyvá válnak a fertőző betegségekkel szemben. Ha ebben az időszakban részesülnek védőoltásban a kiskutyák a vakcina által kialakított immunitás egyszerűen átveszi a védettség szempontjából addig fontos anyai ellenanyagok szerepét.

## Mi történik a védőoltást követően?

Az élet első két vagy három védőoltását a kölykök „Alapimmunizálási program”-juk során kapják meg. A bevezető vakcinázás alacsony szintű immunitást alakít ki és „előhangolja” az immunrendszer „emlékező” elemeit, hogy újraultáskor már teljes védettség fejlődjön ki. A fertőző betegségek elleni folyamatos védettség fenntartása érdekében emlékeztető oltásokra van szükség. A modern kutyavakcinák, mint a NOBIVAC oltóanyagok, bonyolult és alapos kutatómunka eredményei. Ezek a vakcinák hatékonyságban nem maradnak el az emberen alkalmazott vakcinák minőségétől. Az ilyen biztonságos és hatékony oltóanyagokkal már érdemes az első lehetséges alkalommal védeni a kutyákat.

## NOBIVAC GARANCIA

A kutyatulajdonosok azt szeretnék, hogy kedvencük mindig a lehető legjobb ellátásban részesüljön. Különösen fontos ez a betegségek megelőzése esetén, ahol 100%-os hatékonyság lenne kívánatos. Az oltóanyagok biológiai termékek, amelyek hatékonyságát az oltott állat általános állapota is befolyásolja. Ezért mindig előfordulhat, hogy

egy-egy kutya nem reagál megfelelően az oltásra. Az Intervet által gyártott és forgalmazott NOBIVAC vakcinák olyan magas minőségi színvonalat képviselnek, hogy garantálhatjuk azok hatékony működését a kutyák parvovírusos fertőzése, szopornyicája, fertőző májgyulladás és leptospirozisa ellen. Amennyiben egy NOBIVAC vakcinával szabályszerűen oltott kutya mégis megbetegedne az előbb leírt betegség(ek)ben, akkor az INTERVET a garanciában leírt módon és mértékig hozzájárul a gyógykezelés költségeihez, elhullás esetén pedig fájdalomdíjat fizet a tulajdonosnak.

Ez a tulajdonos számára azt jelenti, hogy nemcsak a legjobb védelmet nyújtjuk kedvence számára, hanem anyagi biztonságot is ajánlunk.

A NOBIVAC GARANCIA feltételeiről érdeklődjön állatorvosánál!

---

## A kutya fontos fertőző betegségei

---

### Veszettség

A veszettség, egyéb más állatfajok mellett, a kutyák olyan gyógyíthatatlan vírusos megbetegedése, amely az emberre is közvetlen veszélyt jelent. Mivel a veszettségben megbetegedett ember vagy kutya gyógyíthatatlan, a megelőző jellegű védőoltás az egyetlen védekezési lehetőség. A kutya védőoltásával önmagunkat és környezetünket is védjük. A kutyák veszettség elleni védőoltását hazánkban jogszabály írja elő. Az oltás idejéről és módjáról a kezelő állatorvos tud tájékoztatást adni.

---

### Parvovírusos bélgyulladás

Ezt a megbetegedést egy igen ellenálló vírus okozza, amely az 1970-es években kialakult járvány során sok ezer kutyát megölt, mielőtt hatékony oltóanyagot dolgoztak volna ki.

Fertőzött kutyák bélsarával terjed, de más módon is behurcolható. Már négyhetes kutyák is megbetegedhetnek, de általában az egy évesnél fiatalabb állatok betegsége. Alig csillapítható, bűzös, véres hasmenéssel, hányással, hasi fájdalommal, teljes elesettséggel, étvágytalansággal jár. A folyamat a gyors kiszáradás miatt elhulláshoz vezet. A sikeres vakcináció miatt az előfordulás csökkent, de oltatlan kutyákban ma is gyakran látható. **A korai vakcináció, majd az évenkénti emlékeztető oltás életmentő.**

---

### Szopornyica

Bár a kiterjedt vakcináció következtében jelentősége csökkent, a fertőzés és a betegség különböző formái manapság is jelen vannak. Különösen nagyvárosokban jelentkeznek időről-időre új járványok. A vírus kutyáról kutyára belélegzéssel terjed, lappangási ideje 3 hét is lehet. Döntően 1 évesnél fiatalabb kutyák betegsége, de idősebb állatok is megbetegedhetnek. A tünetek: az orr és a szem váladékozása, köhögés, hányás, láz, étvágytalanság, levertség, hasmenés. Hosszabb idő elteltével a talppárnák megkeményedése és idegrendszeri tünetek, rángógörcsök jelentkezhetnek. A túlélő állatokon rendszeres fogfejlődés, és később rohamokig fokozódó görcskészség, idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. **A gyógykezelés gyakran csak átmeneti eredményre vezet – a megfelelő védőoltásokkal történő megelőzés a legjobb megoldás.**



---

## Fertőző májgyulladás

A fertőző májgyulladás vírusa a kutya máját támadja meg és gyors elhullást okozhat. A betegség a kutyák szoros együttléte esetén állatról állatra közvetlenül terjed. A betegségen átesett állatok 6 hónapon át is üríthetik a fertőző anyagot. Gyakoribb fiatal állatokon, de minden korcsoport fogékony. A kezdeti tünetek gyakran jellegtelene-  
lenek, úgy mint étvágytalanság, rossz közérzet, magas láz, sápadt száj nyálkahártya és kötőhártya, hányás, hasmenés hasi fájdalom. Később jelentkezhet a máj bántalmára utaló sárgaság. A felgyógyuló kutyákban gyakran megfigyelhető a szem szaruhártyájának kékes színű „elfelhősödése”, amely később elmúlik. A 2-es szerotípusú kutya adenovírust tartalmazó vakcinák jó védelmet nyújtanak a kutya fertőző májgyulladására ellen és részlegesen védenek a kennel köhögés ellen is.

---

## Leptospirosis

A leptospirosist baktériumok okozzák, és fertőzött állatok vizeletével terjed. Ha a fertőzött vizelet bőrre kerül, az ember is fertőződhet. A *Leptospira* baktériumok közül kutyán két fontos törzset ismerünk, melyek fertőzött rágcsálók (patkány) vagy kutyák vizeletével terjednek. A májat és a vesét betegítik meg. Magas lázat, elesettséget, hányást, hasmenést, sárgaságot okoznak. Ritka esetekben az első tüneteket követő néhány órán belül a beteg állat el is pusztulhat. A gyógykezelt állatok túlélése gyakori, azonban az átvészelt állat még 1 év múlva is ürítheti a kórokozót, és további fertőzések forrása lehet. **Az éves védőoltás szükséges a kutya védelmére. Így egyben megelőzhető az is, hogy a kutya emberi fertőzés forrásává váljon.**

---

## Kennel köhögés

Általában csoportosan tartott kutyák felsőlégtúti bántalma. Terjedésében fő szerepet játszik a fertőzött és egészséges kutyák közvetlen érintkezése. Rendszerint több kórokozó együttes hatására keletkező, viszonylag jóindulatú megbetegedés. A kórokozók között találhatók a kutyák parainfluenza, adeno, szopornyica, herpes és reo vírusai, a baktériumok közül pedig a *Bordetella bronchiseptica*. A kezdeti tünet „száraz”, csattanós köhögés, enyhén lázas állapot és étvágyvesztés. Ritkán tüdőgyulladássá fejlődik, amelyre a „nedvessé” váló köhögés hívja fel a figyelmet. A gyógykezelés szükséges és a legtöbbször eredményes. A betegség több kórokozója ellen is van vakcina. Különösen csoportosan élő (kennel tartás tenyésztőknél) vagy csoportba gyakran kerülő kutyák (kiállítások) rendszeres megelőző védőoltása indokolt.

---

## Corona vírus

A kórokozó igen elterjedt a kutyák között. Fontossága területenként különböző, általában más mikroorganizmushoz (gyakran parvovírus) kapcsolódva a kialakult betegséget súlyosbíthatja. A tünetek előterében a hasmenés áll. Fiatal állatok esetében fontosabb, de idősebb kutyák is fertőződhetnek. **A megelőző védőoltás nagyvárosokban indokolt.**

# Mikor történjen a vakcinázás?

## „Alapimmunizálási program”

A kölykök vakcinázását már 4–6 hetes korban elkezddhetjük. Mivel a legtöbb kölyök vásárláskor ennél már idősebb, nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a vásárlást követően azonnal állatorvoshoz kell fordulni, hogy az oltási programot kialakíthassa. Idősebb kölyök vagy ismeretlen védőoltási programban részesült felnőtt kutya vásárlásakor se késlekedjen az állatorvost felkeresni. Így lehetővé válik a kutya általános állapotának vizsgálata és az egyéb megelőző kezelések (pl. féregtelenítés) végrehajtása is. Ne felejtse el, hogy a vakcinázás védőhatásának kialakulásához időre van szükség (2–3 hét). Az állatorvostól tanácsot kell kérni arra nézve is, hogy mikor viheti agyálymentesen sétálni új kedvencét. A korai védőoltásoknak köszönhetően időben elkezdhető a kölyök kutya emberi társadalomba történő szoktatása (szocializáció), így a későbbi esetleges viselkedési problémák elkerülése.



## Emlékeztető oltások

A vakcinás védetség sem tart az örökkévalóságig, határfoka idővel csökken, és a kutya újra fogékonyra válik. Rendszeres védőoltásokkal az immunitás fenntartható és a fertőző betegségek elleni védelem kívül, a találkozás lehetőséget ad az állatorvosnak is a rendszeres felülvizsgálatra. Ha a kutya valamilyen okból nem kaphatta meg az esedékes emlékeztető oltást, haladéktalanul forduljon tanácsért az állatorvoshoz.

## Emlékezni fogok az újraoltás idejére?

Az „Alapimmunizálási program” befejezésekor az állatorvos „Oltási Igazolványt” állít ki, amelybe a vakcina címkéjét beragasztja, feltünteti a vakcináció dátumát, és jelzi a szükséges újraoltás idejét. Kutyapanziók, kutyaiskolák nagy valószínűséggel kérni is fogják ezt a megfelelő immunizálást igazoló dokumentumot, de kiállításra e nélkül nem is viheti az állatot. Érdemes megszokni, hogy az „Oltási Igazolványt” mindig vigyük magunkkal, ha kutyánkkal felkeresünk az állatorvost.



## Belső élősködők elleni kezelés

Sok év tapasztalata szerint a kutyakölykök gyakran születnek parazitákkal fertőzötten. Ez egyrészt rossz irányba befolyásolja a köly-



kök életképességét, másrészt nem lehet a beadott oltásokkal megfelelő védettséget kialakítani. Kölyök kutyák esetén az orsóférgesség a legjelentősebb veszély, mert a fertőző lárvákkal már méhen belül vagy az anyaállat tejével is fertőződhetnek. Fertőzési forrást jelent még az anya és az alomtársak bélsara is. Leginkább abból indulhatunk ki, hogy a megszületett kölykök fertőzöttek és ezért kezelésük szükséges.

Az orsóféreg az emberre is veszélyes, általában az állat simogatása után a kezünkről kerülhet fertőző lárvá szerkezetünkbe. Különösen veszélyes ez kisgyermeknek vonatkozásában, mert náluk allergiát, esetenként vakságot is okozhat.

Elsősorban felnőtt kutyák megbetegedése az ún. fonálférgesség és galandférgesség. Ez a fertőzés bágyadtságot, étvágytalanságot vagy adott esetben normál vagy fokozott étvágy mellett lesóványodást okozhat. Mindkét fertőzöttség befolyásolja a fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképesseget is. Egyes galandférgek veszélyesek az emberre is. A kölykök kezelése az INTERVET által forgalmazott, és igen hatékonyan alkalmazható TRIANTEL tablettaival már az első védőoltás beadása előtt, 3–4 hetes korban indokolt és utána rendszeresen végzendő. Az új, érvényben lévő állategészségügyi törvény szerint a kutyák évenkénti féregtelenítése kötelezővé vált. Javasolt azonban az ennél gyakoribb, legalább negyedévenként elvégzett féreghajtó kezelés.

## Figyelmeztetés

- Évente történő emlékeztető oltással tartható fenn a védettség.
- Az „Oltási könyv” fontos dokumentum, amelyet meg kell őrizni.
- Ha a kutya nem érzi jól magát – azonnal érintkezésbe kell lépni az állatorvossal – ezzel akár az állat élete menthető meg.

**Intervet Hungária Kft.**

1095 Budapest, Boráros tér 7/II.

Tel.: 456-3090 ■ Fax: 456-3099

E-mail: [Info.Hungary@Intervet.com](mailto:Info.Hungary@Intervet.com)

[www.intervet.com](http://www.intervet.com)

